基于 O 型口蹄疫病毒 VP2₁₋₃₃ 肽段增强 VP1₁₄₁₋₁₆₀ 肽段免疫原性的新型纳米颗粒疫苗研究

付丽新^{1,2}, 唐冬梅¹, 周彪¹, 刘香易¹, 罗又才¹, 严亨秀¹

摘要:目的 研究 O 型口蹄疫病毒中 VP2₁₋₃₃ 肽段能否增强 VP1₁₄₁₋₁₆₀ 肽段的免疫原性及其可能的免疫机制。方法 分别构建两种新的含有 VP1 和 VP2 的重组质粒 (PcDNA3.1-VP1、PcDNA3.1-VP2), 并将重组质粒制备成纳米颗粒, 检测其体外转染效率。然后将上述纳米颗粒作为基因疫苗免疫 Balb/c 小鼠, PBS 及空载质粒作为对照。液相阻断 ELISA 方法检测不同时间小鼠血清中抗体情况; 流式细胞术和免疫组化染色的方法分析免疫小鼠外周血、脾脏和腹股沟淋巴结中 CD4⁺、CD8⁺ T 淋巴细胞的差异; 淋巴细胞增殖实验检测免疫 28 d 后小鼠外周血中淋巴细胞的增殖能力。结果 对重组质粒进行鉴定, 结果显示重组质粒 (PcDNA3.1-VP1、PcDNA3.1-VP2) 构建成功; 体外转染实验结果显示该纳米颗粒体外转染效率约为 28%, 具有较高的转染效率。ELISA 检测显示 VP1 与 VP2 共同免疫小鼠血清中的抗体滴度均在初次免疫后的第 21 和 28 d 达到最高, 并显著高于对照组 ($F=4.625, P<0.05$); 流式和免疫组化染色结果分析发现 VP1 与 VP2 共同免疫小鼠血液、淋巴结和脾脏中 CD4⁺、CD8⁺ T 淋巴细胞数均显著高于对照组; 淋巴细胞增殖实验结果显示 VP1 与 VP2 共同免疫小鼠淋巴细胞增殖能力均显著高于对照组 ($F=12.73, P<0.05$)。结论 O 型 FMDV VP2 的 1-33 肽段能增强 VP1 的 141-160 肽段的免疫原性, 其可能通过激活细胞免疫和体液免疫实现。

关键词: 口蹄疫; 纳米颗粒; VP1; VP2; 基因疫苗

中图分类号: R392

文献标识码: A

文章编号: 1002-2694(2018)08-0689-08

Increasing immune response of calcium phosphate nanoparticle prepared with VP1₁₄₁₋₁₆₀ and VP2₁₋₃₃ peptide of foot and mouth disease virus serotype O

FU Li-xin^{1,2}, TANG Dong-mei¹, ZHOU Biao¹, LIU Xiang-yi¹, LUO You-cai¹, YAN Heng-xiu¹

(1. College of Life Science and Technology, Southwest Minzu University, Chengdu 610017, China;

2. Department of Dermatovenereology, Chengdu Second People's Hospital, Chengdu 610017, China)

Abstract: We investigated whether the VP2 peptide could increase the immune responses by VP1 peptide and the possible immune-mechanism. Two confirmed constructs were named PcDNA3.1-VP1 and PcDNA3.1-VP2 separately. The plasmids DNA coated nanoparticles of calcium phosphate were prepared. The transfection of the HEK293 cells with the DNA entrapped into calcium phosphate nanoparticles or in free form was carried out with the fluorophor protein coding plasmid DNA CaPi-PcDNA3.1-GFP. The efficiency of transfection of 293HEK cells by the nanoparticle entrapped DNA was markedly higher than the control group. BALB/c mice were divided into four groups randomly. Group A was vaccinated with 200 μ L sterility PBS as control. Group B was vaccinated with 20 μ g CaPi-PcDNA3.1 vector as control. Group C was vaccinated with 20 μ g CaPi-PcDNA3.1-VP1. Group D was vaccinated with 20 μ g CaPi-PcDNA3.1-VP1+20 μ g CaPi-PcDNA3.1-VP2. The serum antibody of mice after immunized was measured by LPB-ELISA. Antibody titers of VP1 and VP2 treated group maintained high levels on 28th dpi and significantly higher than other groups ($F=4.625, P<0.05$). The numbers of CD4⁺ and CD8⁺ T lymphocytes in VP1

and VP2 treated group were both higher than other groups. Lymphocyte proliferation assay showed that the stimulation index (SI) in VP1 and VP2 treated group was significantly higher than other groups ($F=12.73, P<0.05$). The VP2 peptide of FMDV "O" could enhance the immune responses induced by VP1 peptide. Mechanism study suggested that VP2

四川省科技厅应用基础研究项目 (No.18YYJC0228), 中央高校基本科研业务费专项资金项目 (No.2018NZD16) 和西南民族大学校级教改重大培育项目 (No.2017ZDPY01) 联合资助

通讯作者: 严亨秀, Email: 719306512@qq.com

作者单位: 1. 西南民族大学生命科学与技术学院, 成都 610000;

2. 成都市第二人民医院皮肤科, 成都 610017

peptide could enhance the immune response with VP1 peptide by activating the cellular and humoral immune.

Keywords: foot and mouth disease virus; calcium phosphate nanoparticles; VP1; VP2; DNA vaccine

Supported by the Research Grant from Sichuan Provincial Department of Science and Technology (No.18YYJC0228), Special Basic Research Fund of Central Universities (No.2018NZD16), and the Major Cultivation Project of Education Reform of Southwest Minzu University(No.2017ZDPY01)

Corresponding author: Yan Heng-Xiu, Email: 719306512@qq.com

口蹄疫(foot-and-mouth disease, FMD)是一种由口蹄疫病毒(foot-and-mouth disease virus, FMDV)引起的主要感染偶蹄动物的热性、急性、高度传染性疾病。该病可直接或间接地造成严重的经济损失,被世界动物卫生组织(OIE)列为 A 类传染病之首^[1-4]。疫苗接种是当前预防口蹄疫最可靠和有效的方法之一。基因疫苗具有稳定性高、保存时间长、易于生产且能够诱导机体产生免疫应答等优点,具有广阔的应用空间^[5-6]。

口蹄疫病毒是口蹄疫的致病原,口蹄疫病毒属小 RNA 病毒科口蹄疫病毒属,分为 Asia1、SAT1、SAT2、SAT3、O、A 和 C 7 个血清型,各型间没有交叉反应^[7-8]。FMDV 抗原位点由 4 种结构蛋白构成,分别为:VP1、VP2、VP3 和 VP4,其中 VP1 蛋白是结构蛋白中最重要的,它是唯一能够产生保护性中和抗体的结构蛋白^[9-10]。目前研究证明,口蹄疫病毒中至少 3 个中和抗原位点位于 VP1 上;从 FMDV 中分离出来的 VP1 蛋白可以诱导动物产生中和抗体,因此,VP1 作为最主要的抗原位点,具有诱导动物产生中和抗体从而保护机体的作用^[11]。所以在 FMD 新型疫苗的研究中,VP1 蛋白受到高度重视。在真核表达质粒载体中插入 VP1 基因,并将载有 VP1 基因的真核载体转染到受体细胞中,则外源基因产物就会被部分受体细胞表达出来。目前对 VP2 的研究较少,虽已有研究发现在 A 型口蹄疫病毒中 VP2 的 1-33 位氨基酸序列编码的蛋白能够增强 VP1 肽段的免疫原性^[12],但对于 O 型口蹄疫中 VP2 肽段能否增强 VP1 肽段的免疫原性还未见报道。

DNA 转染宿主细胞的效率是影响基因疫苗免疫作用的一个关键问题^[13]。传统的 DNA 转染系统包括病毒载体系统和非病毒载体系统^[14]。由于磷酸钙颗粒具有良好生物相容性、成本低、易配置和毒性低等优势,可作为一种安全有效的非病毒载体具有广阔的应用前景^[15]。此外,磷酸钙纳米颗粒保存时间长,同常用的载体阳离子脂质体相比,其制作简单,节约成本^[16]。

虽然口蹄疫基因疫苗的免疫应答机理还未研究

清楚,但已有研究发现,载体质粒 DNA 可刺激机体 CTL 反应,而这是在蛋白疫苗的免疫反应中无法诱导的,并且还发现当抗原基因被翻译并通过递呈细胞递呈到免疫系统时,在基因疫苗的免疫中还出现 B 细胞反应和 T 细胞反应^[17]。

本实验分别构建两种分别含有 VP1 和 VP2 基因的重组质粒,并用磷酸钙将其包裹成纳米颗粒,作为基因疫苗免疫小鼠,分别应用 ELISA 方法检测小鼠血液中的中和抗体的变化,应用流式细胞术、免疫组化、MTT 等方法检测小鼠各组织及血液中淋巴细胞的变化情况。从而发现各组小鼠之间细胞免疫水平和体液免疫水平的变化差异,来研究 O 型口蹄疫中 VP2 肽段能否增强 VP1 肽段的免疫原性及其可能的免疫机制。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂 20 只 6 周龄雄性 BALB/c 小鼠[批准文号:SCXK(川 2008-24)],体重约为 25 g,购自达硕生物科技有限公司;饲养于 SPF 级别动物房,温度:20 °C,湿度:70°,小鼠自由饮水采食。HEK293 细胞由四川大学生物治疗国家重点实验室馈赠。口蹄疫 O 型液相阻断 ELISA 抗体检测试剂盒购于兰州兽医研究所;CD4、CD8 免疫组化抗体购于 Abcam 公司,CD3、CD4、CD8 流式抗体购于 BD 公司。

1.2 O 型 FMDV 中 VP1 和 VP2 重组基因真核表达载体的构建 在 GenBank 中(AF308157.1)查询猪 O 型口蹄疫病毒的 VP1 的 141-160 位和 VP2 的 1-33 位氨基酸的核苷酸序列,并将 VP1 与 VP2 的核苷酸序列用融合蛋白 linker 连接,并在已知核苷酸序列中加入起始密码子 ATG、终止密码子 TAA 及 *EcoR* I 和 *Xho* I 的酶切位点 GAATTC 和 CTC-GAG,定义为基因 VP1-VP2(如表 1 所示),并将该核苷酸序列委托公司合成,并重组到 PUC57 质粒中,将重组质粒命名为 PUC57-VP1-VP2,并测序鉴定。然后采用 PCR 方法分别扩增 VP1 与 VP2 基因,并测序鉴定,然后同时用 *EcoR* I 和 *Xho* I 分别

对扩增产物及真核表达载体 pCDNA3.1 进行双酶切反应,然后分别将酶切后的 VP1 与 VP2 基因与 pCDNA3.1 连接,构建成两种新的重组质粒,并命名为 pCDNA3.1-VP1 和 pCDNA3.1-VP2。并分别进行酶切验证,PCR 验证及测序验证。VP1 上游引物:5'-TAGAATTCGGCACCATTGACTAACAAACGTGAGAGG-3'。VP1 下游引物:5'-GGGCTC-GAGTTAGGGCAGAGTTCTTTC-3'。VP2 上游引物:5'-GGGGAATTCGCCACCATTGGA-3'。VP2 下游引物:5'-ATCTCGAGTCAAGTCAC-CCCGA CGCTA-3'。

表 1 GenBank 中查询的 VP1₁₄₁₋₁₆₀ 位和 VP2₁₋₃₃ 位的核苷酸序列及设计合成的 VP1-VP2 序列(5'-3')

Tab.1 Sequences of peptide VP1₁₄₁₋₁₆₀ and VP2₁₋₃₃ of FMDV serotype O were from GenBank and the sequences of synthesized VP1-VP2

名称	序列
VP1	act aac aac gtg aga ggc gac ctt cag gtg ctg gct cag aag gca gaa aga act ctg ccc gac aag aag acg gaa gaa acc acc ctc etc gaa gac
VP2	cga ata ttg acc acc cgt aac ggc cac acg acc tcg aca acc cag tet agc gtc ggg gtg act gaa ttc gcc acc atg gac aag aag acg gaa gaa acc acc ctc ctc gaa gac cga ata ttg acc acc cgt aac ggc cac acg acc tcg aca acc cag tet agc gtc ggg
VP1-VP2	gtg act GGC GGC GGC GGC TCT GGC GGC GGC GGC TCT GGC GGC GGC GGC TCT act aac aac gtg aga ggc gac ctt cag gtg ctg gct cag aag gca gaa aga act ctg ccc taa <u>ctc gag</u>

注:划线处为 XhoI 本科切位点

1.3 纳米颗粒制备及转染效率检测

1.3.1 磷酸钙纳米颗粒的制备 分别取 10 μg 上述构建的重组质粒 pCDNA3.1-VP1, pCDNA3.1-VP2 及含有荧光标记的 pCDNA3.1-GFP 质粒先与 150 μL 12.5 mmol/L CaCl₂ 溶液混匀,静置 5 min 后,置于磁力搅拌器上,再分别逐滴加入 150 μL 12.5 mmol/L Na₂HPO₄ 溶液,用 10 mmol/L 柠檬酸钠溶液调 pH 至 7.2,磁力搅拌器搅拌 3 h。

1.3.2 纳米颗粒转染细胞 HEK293 细胞,培养于含 10%胎牛血清的 DMEM 细胞培养基,置于 37 °C 恒温培养箱中,待细胞长至 70%时,将细胞用胰酶消化后,铺于 24 孔板中,每孔细胞数为 2×10⁴。将包裹完成的含 pCDNA3.1-GFP 质粒的纳米颗粒按照每孔 2 μg 质粒的量加入到细胞中,同时加 500 μL 全培养基;并设立阴性对照组,对照组每孔加入

2 μg 没有包裹成纳米颗粒的裸露的质粒 pCDNA3.1-GFP,加入 500 μL 全培养基;12 h 后,更换全新培养基;转染 48 h 后,用荧光倒置显微镜检测两组细胞转染效率。

1.4 VP1 和 VP2 重组基因疫苗的免疫学研究

1.4.1 重组基因疫苗免疫 取 25 只 6 周龄雄性 BALB/c 小鼠随机分为 5 组,每组 5 只,分别为:PBS 对照组;pCDNA3.1 空质粒对照组;pCDNA3.1-VP1 组;pCDNA3.1-VP2 组;pCDNA3.1-VP1 + pCDNA3.1-VP2 组。PBS 组每只小鼠每次肌肉注射灭菌的 PBS 200 μL,其余各组小鼠肌肉注射相对应的纳米颗粒包裹的基因疫苗,每只小鼠每次注射质粒 DNA 20 μg (200 μL),共免疫 3 次,分别为第 0、7 d 和 21 d,在第一次免疫后的第 0、7、14、21、28 d 采血,收集血清,置于 -80 °C 保存。

1.4.2 中和抗体检测 小鼠于初次免疫后的第 0、7、14、21、28 d 分别断尾采血 100 μL,4 °C 3 000 r/min 离心 10 min,收集血清。用口蹄疫 O 型液相阻断 ELISA 抗体检测试剂盒按照其说明书所述方法检测所取血清中的抗体滴度。

1.4.3 流式细胞术 各组小鼠于初次免疫后的第 28 d,眼球摘除取血后颈椎脱臼处死。分别取各组小鼠淋巴结组织、脾脏组织,一部分用于免疫组化分析,另一部分制备成为单细胞悬液,1 500 r/min 离心 3 min,弃上清,PBS 重悬细胞沉淀。小鼠眼球摘除取血,取 20 μL 抗凝的全血样本置于流式管内。淋巴结、脾脏的单细胞悬液和外周血中加入流式抗体 CD3e-PE、CD8a-FITC、CD4-precip 各 1 μL,冰浴 30 min 后,外周血中加入 2 mL 红细胞裂解液,室温裂解 5 min 后,300 g 离心 5 min,弃上清,PBS 洗两次,再用 500 μL PBS 重悬,上机检测。先用空白细胞调节流式细胞仪的前向散射(FSC)与侧向散射(SSC),使细胞能集中分布于视野中央;再分析样品。

1.4.4 免疫组化分析 于小鼠初次免疫后的第 28 d,分别取各组小鼠淋巴结和脾脏组织置于 4%的多聚甲醛中固定 24 h;然后脱水、透明包埋成蜡块,用石蜡切片机 4 μm 连续切片。淋巴结和脾脏组织石蜡切片分别用 CD4 和 CD8 抗体染色,然后用苏木素染色细胞核。光学显微镜下观察阳性细胞,以细胞膜出现黄棕色颗粒且染色强度明显高于背景的非特异性染色为阳性细胞,在×10 目镜×40 物镜下,每个组织随机选取 5 个视野,计数每个视野中的 CD4 或者 CD8 阳性细胞数。

1.4.5 淋巴细胞增殖实验 小鼠免疫后第 28 d,眼球摘除取血后,颈椎脱臼处死。取全血并分离小鼠

外周血单个核细胞(PBMCs)。将 PBMCs 接种至 96 孔板中,每孔 5×10^4 个细胞;再分别在每孔中按 1:100 的量加入 FMDV 灭活疫苗,每孔设 3 个复孔及对照孔,对照孔内只接种细胞,不加病毒抗原。将 96 孔板置于细胞培养箱中 37°C 恒温培养 45 h;在终止培养前 3 h,每孔加 $20 \mu\text{L}$ MTT 溶液(5 mg/mL),继续培养 3 h,终止培养后,96 孔板 2500 r/min 离心 20 min,小心吸除孔内上清液,每孔内加入 $150 \mu\text{L}$ DMSO,置于摇床上震荡 20 min,使结晶物充分溶解。比色:在酶标仪上选择 570 nm 波长测定各孔光吸收值。结果判定:增殖结果用 SI 值表示。SI 值为致密孔细胞的光吸收值与其相对应空白孔的光吸收值的比值。

1.5 统计学分析 实验数据均以均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示,应用 SPSS 16.0 统计软件进行统计学分析,率的比较采用方差分析,以 $P < 0.05$ 为有统计学意义。

2 结果

2.1 重组质粒 PcDNA3.1-VP1 和 PcDNA3.1-VP2 鉴定 目的基因 VP1 和 VP2 片段分别用 PCR 扩增后,再分别与真核表达载体连接转化,在涂有 Amp 的琼脂糖平板上随机挑取菌落提取质粒 DNA 后做酶切分析鉴定。琼脂糖凝胶电泳结果显示在两种新构建的重组质粒中可分别酶切出 VP1 (84 bp) 或 VP2 (123 bp) 片段,表明 VP1 和 VP2 片段已被分别重组到真核表达载体 PcDNA3.1 中,即重组质粒构建成功(图 1B、D)。为进一步确定是否将目的基因 VP1 和 VP2 连接进入真核表达载体 PcDNA3.1 中,分别用设计好的两段基因的引物,在酶切分析鉴定正确的质粒中用 PCR 方法扩增两段基因,PCR 结果显示,在酶切正确的两种质粒中可分别扩增出 VP1 或 VP2 片段,即证明重组质粒构建成功(图 1A、C)。为确定重组质粒中目的基因核苷酸是否发生突变,取经鉴定为 VP1 和 VP2 阳性的克隆送美吉公司测序,结果一致性为 100%,核苷酸序列没有改变。

2.2 纳米颗粒转染效率 用制备好的含有 PcDNA3.1-GFP 质粒的纳米颗粒转染 HEK293 细胞,48 h 后,荧光显微镜下检测转染效率,每组细胞镜下随机选取 5 个视野,计算每个视野的转染效率。用磷酸钙纳米颗粒包裹的荧光质粒转染细胞的转染率(28 ± 2.1)%,用裸露的荧光质粒转染细胞,荧光显微镜下观察不到荧光,即转染率为(1.71 ± 0.05)%,见图 2。

A 和 B:PCR 及酶切分析鉴定的重组质粒 PcDNA3.1-VP1。箭头处可见明显的 DNA 条带。

C 和 D:PCR 及酶切分析鉴定的重组质粒 PcDNA3.1-VP2。箭头处可见明显的 DNA 条带。

图 1 鉴定重组质粒 PcDNA3.1-VP1 和 PcDNA3.1-VP2

Fig.1 PCR and restriction analysis of recombinant plasmids

A: 纳米颗粒包裹的质粒 PcDNA3.1-GFP 转染结果;

B: 裸露的质粒 PcDNA3.1-GFP 转染结果。

图 2 磷酸钙纳米颗粒包裹质粒 PcDNA3.1-GFP 转染 HEK293 细胞

Fig.2 Transmission fluorescence microscopy (magnification 40 $\times$) of HEK293 cells transfected with GFP gene construct

2.3 VP2 可提高免疫小鼠的中和抗体滴度 抗体滴度是检测口蹄疫疫苗是否能够发挥保护作用的重要指标。本实验在小鼠第一次免疫后的第 0、7、14、21、28 d 分别采取小鼠外周血,收集血清,应用口蹄疫 O 型液相阻断 ELISA 抗体检测试剂盒检测小鼠血清中的抗体滴度。

检测时设立 4 孔病毒抗原对照,阳性血清对照与阴性血清对照。应用酶标仪检测每孔在 492 nm 下的吸光值。抗原对照的 4 孔中,弃去最高孔和最低孔吸光值,将剩余两孔的平均吸光值除以 2 定为临界值,表示阻断 50% 反应的对照吸光值。将被检血清吸光值大于该临界值的孔定为阴性孔,小于或

等于临界值的孔定为阳性孔。阳性孔的最高稀释倍数为被检血清的抗体效价。抗体效价大于等于 1:64 ($\text{Log}_{10} \geq 1.8$) 时,99% 以上保护;小于 1:4 ($\text{Log}_{10} < 0.6$) 时,不保护;介于 1:4 和 1:45 之间 (Log_{10} 在 0.6 与 1.65 之间) 时,50% 保护。

图 3 各组小鼠初次免疫后第 0、7、14、21 和 28 d 血清中抗体水平检测

Fig.3 Antibody responses measured at day 28 after immunization by LPB-ELISA (* $P < 0.05$)

实验结果如图 3 所示,VP1 与 VP2 共同免疫小鼠在初次免疫后的第 28 d,平均抗体效价大于 1:

64 ($\text{Log}_{10} > 1.8$),即对口蹄疫病毒有 99% 以上的保护;显著高于其他各组 ($F = 4.625, P < 0.05$)。而 VP1 单独免疫小鼠在初次免疫后的第 7、14、21 和 28 d 外周血中的平均抗体滴度在 1:16 与 1:45 之间,即该组小鼠免疫后对 O 型口蹄疫病毒有 50% 的保护作用;VP2 单独免疫小鼠及对照组小鼠 0~28 d 外周血平均抗体滴度均小于 1:4 即对于 O 型口蹄疫病毒无保护作用。

2.4 VP2 可显著增加免疫后小鼠的 CD8^+ 、 CD4^+ T 淋巴细胞 有研究发现,抗原进入机体后与淋巴细胞最终是在外周淋巴器官内相遇,如淋巴结、脾以及黏膜相关的淋巴组织;在骨髓和胸腺中发育成熟但尚未接触特异性抗原的淋巴细胞不断地从血液循环中挤过毛细血管壁的细胞间隙进入外周淋巴组织,然后又通过淋巴管返回到血液,或在脾中直接回到血液^[18]。在口蹄疫的预防和治疗中,T 淋巴细胞反应起到了很重要的作用。在本实验中,通过流式细胞术、免疫组化方法分析免疫后小鼠血液、脾脏和腹股沟淋巴结组织中 CD8^+ 、 CD4^+ T 淋巴细胞数。

A: 外周血和腹股沟淋巴结中 CD4 阳性 T 淋巴细胞百分数;

B: 外周血、脾脏及腹股沟淋巴结中 CD8 阳性 T 淋巴细胞百分数;

C: 脾脏中 CD8 阳性细胞数;

D: 腹股沟淋巴结中 CD8 阳性细胞数;

E: 腹股沟淋巴结中 CD4 阳性细胞数;

F: 免疫组化结果用方差分析方法进行统计学分析,与对照组比较,* $P < 0.05$ 。

图 4 VP2 可显著增加小鼠免疫组织的 T 淋巴细胞数

Fig.4 CD4^+ and CD8^+ T lymphocytes were significantly increased after vaccinated with CaPi-PcDNA3.1-VP1 + CaPi-PcDNA3.1-VP2

如图 4(A)流式细胞术检测结果所示,小鼠免疫 28 d 后,VP1 和 VP2 共同免疫组小鼠腹股沟淋巴结、脾脏和血液中 CD8⁺ T 淋巴细胞数,与 VP1 单独免疫组, PcDNA3.1 组和 PBS 对照组相比,显著增多($F=35.07, P<0.05$; $F=54.97, P<0.05$; $F=12.66, P<0.05$); VP1 和 VP2 共同免疫组小鼠腹股沟淋巴结和血液中 CD4⁺ T 淋巴细胞数,与 VP1 单独免疫组, PcDNA3.1 组和 PBS 对照组相比,显著增多($F=40.84, P<0.05$; $F=174.1, P<0.05$)。

流式细胞术分析后,取脾脏和腹股沟淋巴结进一步进行免疫组织化学染色,分析各组小鼠脾脏和淋巴结中 CD4 和 CD8 阳性 T 淋巴细胞的差异,并进行统计学分析。如图 4(B)免疫组化结果所示,小鼠免疫 28 d 后,VP1 和 VP2 共同免疫小鼠脾脏中 CD8 阳性细胞数与 VP1 单独免疫组, PcDNA3.1 组和 PBS 对照组相比,显著增多($F=302.7, P<0.0001$); VP1 和 VP2 共同免疫小鼠腹股沟淋巴结中 CD8 阳性细胞数和 CD4 阳性细胞数与 VP1 单独免疫组, PcDNA3.1 组和 PBS 对照组相比,显著增多($F=469.5, P<0.0001$; $F=372.5, P<0.0001$),结果均有统计学差异;免疫组化实验结果与流式细胞术实验结果一致。

2.5 VP2 增强免疫小鼠的 T 淋巴细胞增殖能力

T 细胞在接触抗原后可转化成 T 淋巴母细胞,并可以进一步的分化增殖成致敏 T 淋巴细胞,执行细胞免疫功能,不仅可以直接发挥免疫效应的功能,还可通过产生细胞因子和表达粘附分子而与其他免疫细胞进行直接或者间接接触,发挥广泛免疫调节作用。T 淋巴细胞的增殖反应程度可以反映出 T 淋巴细胞免疫功能状态。

小鼠免疫 28 d 后,取 CaPi-PcDNA3.1-VP1 + CaPi-PcDNA3.1-VP2 组, CaPi-PcDNA3.1-VP1 组, CaPi-PcDNA3.1-VP2 组, 空载质粒对照组及 PBS 对照组小鼠外周血单个核细胞,并调整细胞浓度至 2.5×10^5 cells/mL。灭活 FMDV 疫苗刺激细胞。与对照组比较, * $P<0.05$ 。

图 5 小鼠外周血中 T 淋巴细胞增殖实验

Fig.5 The stimulation index (SI) difference among the different groups

如图 5 所示,淋巴细胞增殖实验结果发现 VP1 单独免疫小鼠的外周血的 T 淋巴细胞增殖率显著高于 VP2 单独免疫组及对照组;同时发现 VP1 和 VP2 共同免疫小鼠的外周血的 T 淋巴细胞增殖率显著高于 VP1 组($F=12.73, P<0.05$)。T 淋巴细胞增殖率可以反映细胞免疫水平,说明 VP1 和 VP2 共同免疫小鼠细胞免疫水平明显好于其他各组。

3 讨论

基因疫苗具有免疫期长,安全性好,成本低,易于构建等优点,尤其是基因疫苗既可诱导体液免疫反应又可诱导细胞免疫反应,被认为免疫学的第 2 次革命^[19]。基因疫苗为细菌、寄生虫和病毒等变态反应性疾病、肿瘤以及自身免疫病的治疗等提供了新的方法。

FMDV 病毒衣壳由 4 种结构蛋白构成,分别为:VP1、VP2、VP3 和 VP4。VP1 蛋白是结构蛋白中最重要的,它是唯一能够产生保护性中和抗体的结构蛋白^[9]。VP1 位于病毒颗粒表面,被胰蛋白酶处理后病毒粒子会失去感染敏感细胞的能力。目前研究证明,口蹄疫病毒中至少 3 个中和抗原位点位于 VP1 上。因此,VP1 作为最主要的抗原位点,具有诱导动物产生中和抗体从而保护机体的作用。VP1 是最重要的抗原蛋白,所以在 FMD 新型疫苗的研究中,VP1 蛋白受到高度重视。在真核表达质粒载体中插入 VP1 基因,并将载有 VP1 基因的真核载体转染到受体细胞中,则外源基因产物就会被部分受体细胞表达出来。在后期的研究中发现,VP1 中决定了免疫原性的主要的抗原表位是 141-160 和 200-213 位氨基酸残基^[20-21]。应用化学方法合成的肽段仍具有免疫原性,并且如果将这些肽段多拷贝串联后,其免疫原性增强。口蹄疫病毒的 4 种结构蛋白中,VP2 相对保守。因此用 VP2 作为抗原检测 FMD 抗体具有其自身的一些优点。目前对 VP2 的研究较少,但已有研究发现在 A 型口蹄疫病毒中 VP2 的 1-33 位氨基酸序列编码的蛋白单独免疫不具有免疫原性,但当与 VP1 肽段共同免疫时能够增强 VP1 肽段的免疫原性^[12]。

本实验构建的重组质粒 PcDNA3.1-VP1 包含 O 型口蹄疫病毒的 VP1 的 141-160 位氨基酸序列,重组质粒 PcDNA3.1-VP2 包含 VP2 的 1-33 位氨基酸序列。分别用单独重组质粒 PcDNA3.1-VP1, 或者重组质粒 PcDNA3.1-VP1 和 PcDNA3.1-VP2, 共同免疫小鼠,检测小鼠各组织的免疫效应,从而探讨是 VP2 肽段能否提高 VP1 肽段的免疫原性及其

可能的免疫机制。

目前有研究认为,最能够有效地摄取外源基因来表达抗原蛋白的组织是肌肉组织,肌肉组织具有很多优点,如体积大、安全、免疫接种容量大等,因此,基因疫苗免疫机体时常选用肌肉注射免疫方式。为了简化免疫程序并能够有效地诱导免疫反应,本实验选择肌肉免疫方式,根据用重组质粒免疫小鼠后均能够诱导体液免疫和细胞免疫的结果,证明了肌肉免疫的优势。也说明了本实验所构建的重组真核表达载体质粒免疫动物后能够在体内表达 FMDV 衣壳蛋白。

口蹄疫抗体滴度检测结果显示,ELISA 检测结果发现 PcDNA3.1-VP1 + PcDNA3.1-VP2 共同免疫的小鼠血清中的平均抗体滴度均在初次免疫后的第 28 d 达到最高,对口蹄疫病毒可产生 99% 以上的保护力,显著高于只用重组质粒 PcDNA3.1-VP1 免疫的小鼠以及对照组小鼠的抗体滴度以及保护力水平。由此可说明,在本实验中,VP2 肽段可增强 VP1 肽段刺激产生抗体水平的能力,抗体的产生与 B 淋巴细胞的活化有关,而 B 淋巴细胞主要参与的是体液免疫反应,即可说明 VP2 肽段可增强 VP1 肽段的体液免疫反应。

T 细胞在接触抗原后可转化成 T 淋巴母细胞,并可以进一步的分化增殖成致敏 T 淋巴细胞,执行细胞免疫功能,不仅可以直接发挥免疫效应的功能,还可通过产生细胞因子和表达粘附分子而与其他免疫细胞进行直接或者间接接触,发挥广泛免疫调节作用。T 淋巴细胞的增殖反应程度可以反映出 T 淋巴细胞免疫功能状态。常用的检测淋巴细胞增殖反应强度的实验方法为 MTT 法。细胞能量代谢水平可采用 MTT 法检测,活细胞特别是增殖期的细胞能量代谢旺盛,MTT(四甲基偶氮唑盐)可被线粒体在能量代谢中可产生琥珀酸脱氢酶由淡黄色还原为蓝紫色结晶,沉积在细胞周围和细胞内,增殖细胞数与结晶的形成成正比。本实验采用 MTT 法检测免疫后小鼠外周血中 T 淋巴细胞增殖情况。结果显示淋巴细胞增殖实验结果显示 PcDNA3.1-VP1 + PcDNA3.1-VP2 共同免疫的小鼠淋巴细胞增殖能力均显著高于 PcDNA3.1-VP1 免疫的小鼠以及对照组小鼠。由此可说明 VP2 肽段可增强 VP1 肽段所诱发的 T 淋巴细胞增殖能力,T 淋巴细胞主要参与的是细胞免疫反应,即可说明 VP2 肽段可增强 VP1 肽段的细胞免疫反应。

有研究证明,在没有抗体的情况下,基因疫苗诱导产生的细胞免疫反应具有抗病毒感染的作用。基

因免疫也可诱导体液免疫产生中和抗体,提供抗病毒感染保护作用。通过对本实验中接种重组基因疫苗的小鼠血清中口蹄疫抗体水平和各免疫组织中 T 淋巴细胞增殖反应的结果分析,说明在基因疫苗发挥免疫保护能力过程,除了能够产生特异性抗体的体液免疫反应外,T 淋巴细胞介导的细胞免疫反应也发挥了重要作用。

CD4⁺ T 淋巴细胞可被主要组织相容性复合物(MHC II)递呈的多肽抗原反应所激活,从而激活辅助性 T 细胞与 B 细胞产生体液免疫反应;CD8⁺ T 淋巴细胞可通过 MHC I 与抗原结合诱导机体产生细胞免疫反应。本实验分别采用流式和免疫组化染色方法检测免疫后小鼠的血液、脾脏和腹股沟淋巴结中 CD4⁺ T 淋巴细胞和 CD8⁺ T 淋巴细胞的变化。结果显示 PcDNA3.1-VP1 + PcDNA3.1-VP2 共同免疫的小鼠血液和淋巴结中 CD4⁺、CD8⁺ T 淋巴细胞数、脾脏中的 CD8⁺ T 淋巴细胞数均高于 PcDNA3.1-VP1 免疫的小鼠以及空质粒对照组和 PBS 对照组小鼠。由此可推断 VP2 肽段能够增强 VP1 诱发体液免疫和细胞免疫水平,其机制可能是 VP2 肽段通过激活机体免疫组织和血液中的 CD4⁺、CD8⁺ T 淋巴细胞而提高 VP1 肽段的免疫原性。

本实验研究发现 PcDNA3.1-VP1 与 PcDNA3.1-VP2 共同免疫的小鼠细胞免疫水平和体液免疫水平均显著高于用只含有 VP1 肽段免疫的小鼠以及空质粒对照组和 PBS 对照组小鼠。说明相对于单独的 VP1 基因疫苗,无论是 VP1 与 VP2 两种基因疫苗共同作用后能够诱发机体更强的免疫反应,提示 O 型 FMDV VP2 的 1-33 肽段能增强 VP1 的免疫原性,其可能通过激活 CD4⁺、CD8⁺ T 淋巴细胞诱导的体液免疫和细胞免疫实现。

参考文献:

- [1] Parida S, Oh Y, Reid SM, et al. Interferon gamma production *in vitro* from whole blood of foot-and-mouth disease virus (FMDV) vaccinated and infected cattle after incubation with inactivated FMDV [J]. *Vaccine*, 2006, 24(7):964-969. DOI: 10.1016/j.vaccine.2005.08.108
- [2] 汪洋, 亢文华, 白永平, 等. 口蹄疫研究概况 [J]. *中国畜牧兽医*, 2004, 31(9): 47-49. DOI: 10.3969/j.issn.1671-7236.2004.09.018
- [3] 郑敏, 金宁一, 秦晓冰, 等. 口蹄疫重组鸡痘病毒诱导猪特异性细胞毒性 T 淋巴细胞(CTL)杀伤活性检测 [J]. *中国生物工程杂志*, 2005, 25(5): 50-54. DOI: 10.3969/j.issn.1671-8135.2005.05.011
- [4] 王文秀, 张永光, 陈德坤, 等. 亚洲 I 型口蹄疫病毒 VP1 基因的克隆及表达 [J]. *中国兽医科技*, 2005, 35(1): 1-4. DOI: 10.3969/

j.issn.1673-4696.2005.01.001

- [5] Beard C, Ward G, Rieder E, et al. Development of DNA vaccines for foot-and-mouth disease, evaluation of vaccines encoding replicating and non-replicating nucleic acids in swine [J]. *J Biotechnol*, 1999, 73(2/3):243-249. DOI: 10.1016/S0168-1656(99)00142-X
- [6] Sorensen KJ, Madsen KG, Madsen ES, et al. Differentiation of infection from vaccination in foot-and-mouth disease by the detection of antibodies to the non-structural proteins 3D, 3AB, 3ABC in ELISA using antigens expressed in baculovirus [J]. *Arch Virol*, 1998, 143(8):1461-1467. DOI: 10.1007/s007050050390
- [7] Belsham GJ. Distinctive features of foot-and-mouth disease virus, a member of the picornavirus family, aspects of virus protein synthesis, protein processing and structure [J]. *Prog Biophys Mol Biol*, 1993, 60(3):241-260. DOI: 10.1016/0079-6107(93)90016-D
- [8] Domingo E, Escarmis C, Baronowski E, et al. Evolution of foot-and-mouth disease virus [J]. *Virus*, 2003, 91(1):47-63. DOI: 10.1016/S0168-1702(02)00259-9
- [9] Aggarwal N, Barnett PV. Antigenic sites of foot-and-mouth disease virus (FMDV): an analysis of the specificities of anti-FMDV antibodies after vaccination of naturally susceptible host species [J]. *J Gen Virol*, 2002, 83(2):775-782. DOI: 10.1099/0022-1317-83-4-775
- [10] Knowles NJ, Samuel AR. Molecular epidemiology of foot-and-mouth disease virus [J]. *Virus*, 2003, 91(1):65-80. DOI: 10.1016/S0168-1702(02)00260-5
- [11] Parry NR, Barnett PV, Ouldrige EJ et al. Neutralizing epitopes of type O foot-and-mouth disease virus II Mapping three conformational sites with synthetic peptide reagents [J]. *J Gen Virol*, 1989, 70(6):1493-1503. DOI: 10.1099/0022-1317-70-6-1493
- [12] Wang JL, Liu MQ, Han J, et al. A peptide of foot-and-mouth disease virus serotype Asia1 generating a neutralizing antibody response, and an immunostimulatory peptide [J]. *Vet Microbiol*, 2007, 125(3/4):224-231. DOI: 10.1016/j.vetmic.2007.05.033
- [13] Wivel NA, Wilson JM. Methods of gene delivery [J]. *Hematol Oncol Clin North Am*, 1998, 12(3):483-495. DOI: 10.1016/S0889-8588(05)70004-6
- [14] Wada K, Arima H, Tsutsumi T, et al. Improvement of gene delivery mediated by mannosylated dendrimer α -cyclodextrin conjugates [J]. *J Controlled Release*, 2005, 104(2):397-404. DOI: 10.1016/j.jconrel.2005.02.016
- [15] Vijayanathan V, Thomas T, Thomas TJ. DNA nanoparticles and development of DNA delivery vehicles for gene therapy [J]. *Biochemistry*, 2002, 41(48):1408-1416. DOI: 10.1021/bi0203987
- [16] Parker AL, Oupicky D. Methodologies for monitoring nanoparticles formation by self-assembly of DNA with poly(L-Lysine) [J]. *An Biochem*, 2002, 302(1):75-81. DOI: 10.1006/abio.2001.5507
- [17] Read M L, Singh S, Ahmed Z, et al. A versatile reducible polycation-based system for efficient delivery of a broad range of nucleic acids [J]. *Nucleic Acids Res*, 2005, 33(9):86-93. DOI: 10.1093/nar/gni085
- [18] Sangar DV, Black DN, Rowland DJ, et al. Location of the initiation site for protein synthesis on foot-and-mouth disease virus RNA by in vitro translation of defined fragments of the RNA [J]. *J Viro*, 1980, 33(1):59-68. DOI: 0022-538X/80/01-0059/10 \$ 02.00/0
- [19] Wilson SP, Liu F, Wilson RE, et al. Optimization of calcium phosphate transfection for bovine chromaffin cells: relationship to calcium phosphate precipitate formation [J]. *Anal Biochem*, 2011, 226(2):212-220. DOI: 10.1006/abio.1995.1216
- [20] Strohmaier K, Franze R, Adam KH. Location and characterization of the antigenic portion of the FMDV immunizing protein [J]. *J Gen Virol*, 1982, 59(2):295-306. DOI: 10.1099/0022-1317-59-2-295
- [21] Meloen RH, Barteling SJ. An epitope located at the C terminus of isolated VP1 of foot-and-mouth disease virus type O induces neutralizing activity but poor protection [J]. *J Gen Virol*, 1986, 67(2):289-294. DOI: 10.1099/0022-1317-67-2-289

收稿日期:2017-09-21 编辑:张智芳